



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

I JORNADA DE INVESTIGACIÓN UNAT-A 2005



LIBRO DE RESÚMENES

CHACHAPOYAS

**Plantas medicinales en el departamento de Amazonas:
Chachapoyas, Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza.
Chachapoyas, Perú 2004**

MsC. Flor Teresa García Huamán¹

**Dpto. de Ciencias Básicas. Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial.
Universidad Nacional "Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"
Chachapoyas - Perú**

RESUMEN

La presente investigación en plantas medicinales fue realizada en el Departamento de Amazonas, provincias de: Chachapoyas, Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza, donde se realizaron muestreos sistemáticos, recorriéndose aleatoriamente las diferentes vías de acceso colectando las muestras deseadas.

El método de colección fue el estandarizado para herborización, registro y catalogación de especies. Además se realizaron entrevistas y encuestas a los pobladores que se dedican a curar con plantas, lo que permitió ubicarlas con mayor facilidad y de esta manera registrar sus utilidades curativas. Para el procesamiento taxonómico se siguió el Método Ortodoxo o Clásico.

Los resultados se presentaron de acuerdo al sistema de clasificación de Alfred Engler, encontrándose que en las cuatro provincias estudiadas existe gran diversidad de plantas medicinales cuyos usos son variados, siendo el 97,9% Angiospermas y de estas el 95,71% son Dicotiledóneas y el 4,29% Monocotiledóneas. De las Dicotiledóneas el 57,46% pertenecieron a la sub clase Archyclamidea y el 42,54% a la sub clase Metachlamydeae, registrando y realizando el montaje respectivo de 153 especies medicinales y sembrando 84 especies en una parcela experimental.

Palabras claves: Plantas medicinales

¹flor_gh242@hotmail.com
Telef: 44-9789211

**Determinación
por levadura**

**Dpto. de Ciencias Básicas
Universidad Nacional**

El propósito del presente trabajo es determinar la actividad de "pur-pur" *Pasiflora* de "Chamboro" *Carica pubescens* CO₂ a partir de la sacarosa.

Las muestras de mostaza se colocaron en placas petri que contenían se replicaron en placas de cada tipo de fruta y se incubaron.

En la evaluación de la actividad de Sebarroja, en cada cultivo a temperatura ambiente por 96 horas, respectivamente.

Se concluyó que las levaduras de las levaduras de chamboro obtenidas de: pur-pur, mora.

Palabras clave: Levaduras